



Otimização da hemoglobina pré-operatória

Área: Segurança. Eficiência. Eficácia.

Definição: Proporção de doentes com idade igual ou superior a 18 anos submetidos a procedimentos eletivos em que foi efetuada a otimização da hemoglobina de acordo com as recomendações.

Numerador: Número de doentes com idade ≥ 18 anos a quem foi efetuada otimização pré-operatória da hemoglobina submetidos a procedimentos eletivos em que esta está indicada.

Denominador: Todos os procedimentos anestésicos eletivos, em doentes com idade ≥ 18 anos, em que é recomendada a otimização de hemoglobina.

Recomendações complementares:

1. Entende-se por otimização da hemoglobina a obtenção de valores alvo de Hemoglobina >13 g/dL em doentes de sexo masculino e >12 g/dL em doentes de sexo feminino
2. Os procedimentos cirúrgicos em que é recomendada a otimização pré-operatória da hemoglobina são os seguintes:
 - Cirurgia urológica – recessão transuretral prostática, nefrectomia, biópsia renal
 - Cirurgia a órgãos altamente vascularizados, tais como, rim baço, fígado
 - Cirurgia de recessão intestinal
 - Cirurgia ortopédica major
 - Cirurgia oncológico
 - Cirurgia cardíaca